

Полярная крачка *Sterna paradisaea* – новый вид авифауны Московской области

А.Н.Балаев

Александр Николаевич Балаев. Москва, Россия. E-mail: balaev.alexandr@yandex.ru

Поступила в редакцию 24 октября 2024

Полярная крачка *Sterna paradisaea* – обычный, фоновый вид летней тундры в России. Гнездовая часть её ареала охватывает примыкающие к Северному Ледовитому океану территории Евразии и Северной Америки, острова и побережья северной Атлантики и северной Пацифики. Зимуют полярные крачки в зоне пакового льда морей, омывающих Антарктиду. Обычные пути пролёта сибирских и европейских птиц к местам зимовки проходят вдоль берегов Евразии на запад и далее вдоль западных побережий Европы и Африки по направлению к югу (Зубакин 1988). Было показано, что полярная крачка является одним из самых дальних мигрантов по расстоянию от мест гнездования до района зимовок. Осенняя миграция начинается уже в конце июля, а к местам зимовок птицы прилетают в середине ноября. Средняя протяжённость миграционного пути составляет 45 тыс. км (44993 ± 8381 км), время перелёта чуть больше 100 сут (104 ± 8 сут). К местам гнездования полярные крачки возвращаются в третьей декаде мая. Длительность весенней миграции значительно меньше, в среднем 61 сут (61 ± 10 сут). Длина перелёта также короче – около 29 тыс. км (29098 ± 3785 км). Значительных различий в скорости миграции в южном и в северном направлениях не установлено (Волков и др. 2017).

Известно, что некоторые полярные крачки, особенно молодые во время осенней миграции к местам зимовок, могут сбиваться с магистрального пути пролёта, их обнаруживают в глубине материка. Так, молодые птицы в последних числах августа 1958 и 1960 годов были встречены в Челябинской области, Хмельницкой области и в северо-западной части Чёрного моря (Бианки 1967). В августе 1966 года одна полярная крачка была найдена мёртвой на Северном Кавказе в Ставропольском крае. Птица была окольцована Стокгольмским музеем в Швеции. Удалённость её находки от места кольцевания по прямой линии составила 2397 км (Лохман, Маловичко 2017).

В Московской области полярная крачка ранее не наблюдалась (Калякин и др. 2023), поэтому встречу 16 октября 2024 на Рыжовском пруду (поселение Вороново) полярных крачек можно считать регистрацией нового вида птиц для области. По информации, внесённой в базу данных iNaturalist.org, ближайшие от Московской области точки встреч по-

лярной чайки находятся в Великом Новгороде – 14 октября 2023 (идентификатор наблюдения 187475220) и Владимире – 2 октября 2021 (идентификатор наблюдения 97045617). Примечательно, что в обоих случаях это были молодые птицы, принятые вначале за речную крачку.

Действительно, во всех нарядах полярная *Sterna paradisaea* и речная *Sterna hirundo* крачки очень схожи (Калякин, Коблик 2014). В европейской части России они редко встречаются вместе, поэтому отнесение наблюдаемой птицы к одному из видов редко вызывает трудности. Исключение как раз составляют молодые крачки. Одним из основных полевых отличительных признаков у молодых крачек этих видов является цвет надхвостья: у речной крачки оно серое, а у полярной – белое. Кроме того, у молодой полярной крачки второстепенные маховые (обычно хорошо заметные у летящей птицы) белые, без тёмной полосы, которая присутствует у речной крачки.

Во время обследования Рыжовского пруда и его окрестностей (поселение Вороново) 16 октября 2024 мною обнаружены две крачки, летающие около широкой части пруда. Они наблюдались с расстояния 100–150 м. Крачки кормились, периодически зависали на небольшой высоте над зеркалом воды в поисках небольших рыбок. Обнаружив добычу, они ныряли и взлетали уже с рыбкой в клюве. Охота проходила довольно успешно – за 5 мин наблюдения они поймали трёх рыбок на двоих. Приняв молодых крачек за речных, я сделал серию фотографий (рис. 1), показалось интересным их присутствие в середине октября в Московской области. Ввиду малого количества водных птиц далее обследование было продолжено на примыкающих к пруду полях.



Рис. 1. Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Рыжовский пруд. Поселение Вороново. Московская область. 16 октября 2024. Фото автора.

Вечером при просмотре на компьютере сделанных на Рыжовском пруду фотографий оказалось, что исходное определение вида птиц было неверным. Имеющиеся признаки: белый цвет надхвостья и второстепен-

ных маховых перьев, — указывали на молодую полярную крачку. Внешнее сходство молодых особей этих двух видов и отсутствие регистрации полярной крачки в Московской области привело к первоначальному неверному определению.

В последующие дни, 17 и 18 октября, удалось наблюдать этих крачек по несколько часов. Были сделаны фотографии с близкого расстояния (рис. 2), на которых более заметны видовые отличительные признаки.



Рис. 2. Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Рыжовский пруд. Поселение Вороново. Московская область. 18 октября 2024. Фото автора

Если 16 октября птицы кормились парой, то 17 и 18 октября полярные крачки держались в зоне видимости поодиночке. Поймав 1-2 рыбки, крачка улетала в дальний конец пруда (устье реки Поляница) и скрывалась из вида. Изредка (2 раза за весь период наблюдения) она садилась отдыхать на воду. Период отсутствия птиц обычно составлял от 15 до 60 мин. За 2 ч наблюдений 18 октября полярная крачка посетила Рыжовский пруд для охоты только один раз, сложилось впечатление, что она осталась в одиночестве. Начиная с 17 октября нахождение полярных крачек в указанном месте подтверждено и другими наблюдателями. Их данные внесены в базы данных iNaturalist.org и «Онлайн дневники наблюдений» на <http://www.ru-birds.ru>. Последние встречи полярной крачки на Рыжовском пруду зарегистрированы 19 октября 2024, позднее они уже не отмечались.

Таким образом, полярную крачку можно считать новым залётным видом Московской области.

Автор благодарен за помощь в определении вида Г.Н.Исакову.

Л и т е р а т у р а

- Бианки В.В. 1967. Кулики, чайки и чистиковые Кандалакшского залива // *Тр. Кандалакшского заповедника* 4: 1-364.
- Волков А.Е., Лоонен М., Волкова Е.В., Денисов Д.А. 2017. Новые данные о миграции полярных крачек Онежского полуострова Белого моря // *Орнитология* 41: 58-68. EDN: PPNFYU.
- Зубакин В.А. 1988. Полярная крачка – *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 // *Птицы СССР. Чайковые*. М.: 337-348.
- Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В.В., Зубакин В.А. Морковин А.А. 2023. *Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области*. М.: 1-60.
- Калякин М.В., Коблик Е.А. 2014. *Полный определитель птиц европейской части России*. В 3 частях. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2: 187-190.
- Лохман Ю.В., Маловичко Л.В. 2017. Полярная крачка *Sterna paradisaea* на Северном Кавказе // *Рус. орнитол. журн.* 26 (1440): 1808-1809. EDN: YLOZMN.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2024, Том 33, Экспресс-выпуск 2468: 4608-4609

Свидетельство гнездования дербника *Falco columbarius* в окрестностях села Абрамцево (Сергиево-Посадский городской округ, Московская область)

О.С.Рулёва, В.В.Кузнецова, Т.Р.Язаров

Ольга Сергеевна Рулёва, Валерия Владиславовна Кузнецова. Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва, Россия. E-mail: rulevaolga72@gmail.com; valeriya.v.k@yandex.ru
Тимур Ринатович Язаров. Москва, Россия

Поступила в редакцию 23 октября 2024

В настоящее время дербник *Falco columbarius* относится к числу редких птиц Подмосковья (Калякин и др. 2023). В Красной книге Московской области он имеет статус 1-й категории как гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчезновения (Мищенко 2018). Случаи гнездования были отмечены в Талдомском районе (Волошина 2017; Ерохин 2008; Конторщиков и др. 2014), в окрестностях Красногорска (Калякин, Волцит 2006, Мельников и др. 2009), в Лотошинском рыбхозе (Авдеев 2022) и в Дубне (Шведко и др. 2023). Основным фактором сокращения численности дербников в области является разрушение мест его гнездования – осушение торфяных болот (Мищенко 2018).

12 июля 2024 на юге Сергиево-Посадского городского округа были обнаружены два слётка дербника. Место гнездования находится вблизи села Абрамцево, рядом проходит железная дорога. Наблюдение за выводком велось в течение недели. Большую часть времени молодые птицы